分回**心**皆分切》的安全使用的金额居

いま周辺住民、農作物、環境などへの配慮が求められています。

夕回ルピクリシ(は農林水産省)。環境省令で被覆が必要な農薬に指定されています。

住宅、畜舎、鶏舎周辺ではガスによる危害 防止に配慮(例えば、気温・風向き、厚め のシートで被覆、事前のお知らせ等)。

誤飲、誤使用、盗難等を防ぐため、食品等 と分けて、鍵のかかる冷暗所に「医薬用 外劇物」と表示して保管し、台帳管理。

眼、のど、鼻を刺激するので防護 マスク(土壌くん蒸用)と保護メガ ネのゴーグル等の適切な保護具 を着用。



安全使用 6つのポイント



薬液は使い切り、他の空容器への 移し替え・小分けの禁止。使用 済容器は残液・残臭を確認して、 産業廃棄物として処分。

> 作業(被覆)後は直ちに密閉。臭気 が無いことを確認して入室。



ハウスでは開け放してから処理し、

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。

◆人家、畜舎、鶏舎周辺での使用に当たっては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮してください。◆保管するときは、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

クロルピクリン工業会 TEL: 03-3553-7050

南海化学株式会社 TEL: 06-6532-5590

日本化薬株式会社 TEL: 03-6731-5321

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 ナビダイヤル 26.0570-077557

空き容器処理

缶やボトルの底や側壁面に わずかに残った液は下記の 手順で処理し、空き缶、空き ボトルは完全に臭気を抜い てください。

缶、ボトルにクロルピクリンが 残ったままゴミとして廃棄され

ると、廃棄物処理場等で

働く人が被害を

受けます。



空き缶の残液処理

●周囲に影響を及ぼさ ない場所に、小さな窪 みを作り、缶の口栓を はずし、窪みの中に収 まるよう缶をひっくり 返し倒立させます。



2年が倒れないよう、土 寄せをしてください。 この時、缶の中の残液 が出やすくなるよう、 傾かないように立て てください。



3

収

臭いが完全に抜けたことを 確認して、圃場から回収しま しょう。




2

空き缶の残臭処理

❸そのまま、缶を倒立さ せておくと、中の臭気 は徐々に抜けていき ます。



4 1ヶ月後、缶を再度 ひっくり返し上向きに し、臭いを確認します。 臭いが残っていればそ のままさらに静置し、 完全に臭いがなくなる のを待ちます。



ほぼ 1ヶ月で

臭気は

抜けます

4

廃棄処分

回収した容器は臭気がない ことがわかるように口栓をし ないで適切に産業廃棄物と して処分してください。

空きボトルも 同様に 残液・残臭処理を してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。

◆人家、畜舎、鶏舎周辺での使用に当たっては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮してください。◆保管するときは、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

クロルピクリン工業会 TEL: 03-3553-7050

南海化学株式会社 TEL: 06-6532-5590

日本化薬株式会社 TEL: 03-6731-5321

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 ナビダイヤル 260570-077557